

Brugervejledning for Nutri Novo Lac

Hvorfor bruge Nutri Novo Lac:

Mange smågrisebesætninger oplever stigende resistens over for forskellige antibiotika. I Danmark er problemet blevet mere udtalt efter, at fravænnede grise ikke længere får tilsat medicinsk zink i foderet.

Håndtering i praksis:

1. Hæld Nutri Novo Lac fra basisflasken over i en egnet beholder og påmonter drenshpumpe.
2. Hæng evt.pumperne på de stier, hvori der behandles grise. (Det giver et nemmere overblik)
3. Vær opmærksom på at dosere bag grisens tunge, da Nutri Novo Lac smager bittert.
4. Brug IKKE antibiotika på grise der har fået Nutri Novo Lac, da antibiotika ødelægger virkningen fra Nutri Novo Lac.
5. Anvendes fra grisens 3-5 levedøgn.

Dosering:

1. Pattegrise efter 3-5 levedøgn. Ved lind mave. 1 ml./gris i 3 dage, eller efter behov.
2. Gyltekuld efter 3-5 levedøgn, der udfordres af god mælk. 1ml./gris i 3 dage, eller efter behov. Forebyggende 1 ml./gris.
3. Pattegrise der tillægges ammesøer, efter 3-5 levedøgn. 1 ml./gris i 3 dage, eller efter behov. Forebyggende 1 ml.
4. Ældre pattegrise, med mave/tarm forstyrrelser. 2-3ml./gris i 3 dage, eller efter behov. Herefter ved behov.
5. Fravænnede grise, der udfordres af løse maver 3-5 ml./gris 3 dage, eller efter behov. Herefter ved behov.